

Mémoire

Envoyé à M. Morand, Secrétaire de l'Académie Royale de Chirurgie le neuf
novembre 1756.

Sur L'opération de la hernie inguinale et de la Crurale

Qui établit et prouve d'après l'expérience et la théorie que la Dilatation
graduée et ménagée de l'anneau et de l'arcade Crurale, proposée par l'auteur
est préférable à la coupe, incision ou débâchement qu'on y pratique
ordinairement

Présenté à l'Académie Royale de Chirurgie
Par M. Le Blanc.

Le But que je me proposai dans le précis d'observations que j'ai
communiqué à l'Académie, en 1752, étoit de prouver, d'après l'expérience,
la possibilité de la Dilatation de l'anneau et de l'arcade Crurale, et dans
ce cas la préférence qu'elle devoit avoir sur la coupe ou le débâchement
prescrit par tous les auteurs qui ont écrit sur cette opération. J'ai
depuis recueilli de nouvelles observations qui concourent à autoriser
cette pratique. Le mémoire que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui
renferme ces mêmes observations, appuyées sur des principes tirés
du raisonnement. Une mauvaise méthode peut être son expérience,
son succès même; mais, l'expérience ne peut être constante
qu'autant qu'elle est confirmée par une saine théorie. J'établirai,
avec le plus de précision qu'il me sera possible, les raisons qui
doivent déterminer à la dilatation. J'ai en conséquence, divisé ce
mémoire en trois articles. Le 1^{er} contient les Vues qu'on doit
se proposer dans l'opération. Le 2^e renferme les Expériences qui
déterminent à donner la préférence à la dilatation, et le 3^e Vient



à l'appui par le raisonnement ou la théorie pour en confirmer
la validité

Article Premier

Vues principales qu'on doit se proposer dans l'opération.

Les Vues principales qu'on doit se proposer dans l'opération consistent
principalement dans l'aggrandissement du passage ou se fait l'étranglement
des parties qui forment la hernie, afin de pouvoir les faire rentrer
dans la capacité du ventre, de les y mettre en liberté et par ce moyen
faire cesser les accidents qui menacent le malade d'une mort prochaine.

Jusqu'ici les maîtres de l'art ont enseigné que pour procurer cet
aggrandissement, il falloit faire à l'anneau ou à l'arcade crurale, un
débâtement, une coupe ou incision plus ou moins grande, & pour
élargir ou aggrandir le passage, afin de faire rentrer avec facilité
les parties sorties.

Les Dangers attachés à cette coupe ont jusqu'ici occupé les grands
chirurgiens, et les ont portés à imaginer des instruments propres
à les éviter. De là sont venus les Bistouris cachés de M. M.
le Dron et Petit; celui de M. Morand, sa sonde cannelée à l'Arcade,
pour garantir l'intestin du tranchant de l'instrument. L'expérience
ayant fait connoître que ces machines, quelque bien imaginées
qu'elles fussent, n'étoient point exemptes des dangers attachés au
débâtement, on leur a préféré le simple bistouri-boutonné.

quelques-uns se servent encore avec succès de la sonde de M. Morand;

Nota: M. Sharp la Prescrit d'un travers de pouce.

d'autres n'employant pour sonde et pour conducteur, que le doigt.

Tous ceux qui ont écrit sur cette opération prescrivent, dans tous les cas, sans en excepter aucun, le débridement, avec le tranchant de l'instrument. Mais est-il bien certain qu'il faille faire dans tous les cas ce débridement ? non assurément ; l'expérience prouve le contraire.

Article Deuxieme

Preuves tirées de L'expérience.

Je vais détailler la première observation qui m'a fait naître l'idée de la dilatation. Jusques là, je suivais, dans cette opération, ce que m'avoient enseigné les maîtres de l'art, et, dans tous les cas, je débridois toujours l'anneau ou le ligament de fallope.

Au mois de may 1750, je fus appelé pour aller à trois lieues d'Orléans, faire l'opération à un homme âgé de 27 ans. L'étranglement subsistoit depuis six jours ; le malade vomissoit les matières intestinales, il avoit le hoquet, le poulx petit et concentré, le ventre considérablement tendu ; la tumeur étoit assez grosse et paroissoit être formée par l'intestin. Après l'ouverture du sac herniaire et l'intestin découvert, qui étoit seul, très tendu, j'en tirai un peu l'intestin, pour voir s'il n'étoit point adhérent à l'anneau ; par ce moyen j'amena au dehors l'endroit de l'intestin qui étoit étranglé ; puis, ayant porté le bout du doigt index de la main gauche dans l'anneau pour servir de conducteur au bistouri-boutonne, à l'effet de faire le débridement, je m'aperçus en poussant le bout du doigt, que l'anneau prêtoit un peu. Dans ce moment, la dilatation graduée et ménagée que je fais ordinairement avec



le doigt au Sphinctere de la Vessie dans l'opération de la taille, me revint à l'Esprit, et je pensai que je pourrois dilater de même cet anneau, sans y faire de débilement et sans meurtre ni blesser l'intestin. Jugant qu'il pouvoit y avoir de la possibilité, je continuai d'introduire le doigt par degrés, et je sentis que l'anneau se dilatoit successivement et prètoit aux petits efforts que j'ay faisois. Pendant cette introduction, je tirai un peu avec la main droite le paquet intestinal, a fin de l'empêcher de suivre le mouvement du doigt, et le doigt introduit étoit posé de manière que sa face interne touchoit l'intestin, qui étoit plissé dans le passage, et l'ongle regardoit la partie Supérieure de l'anneau. Dans cette position je dilatois par degrés l'anneau, en y introduisant successivement tout le doigt. au moyen de cette dilatation, qui se trouva suffisante, j'eus la facilité de faire rentrer l'intestin, de la manière usitée dans cette opération. L'intestin rentré je pansai le malade à l'ordinaire; les accidens cessèrent; il se est bien rétabli, et jouit actuellement d'une santé parfaite.

Depuis cet Essai, j'ai fait une autre opération à une femme âgée de 25 ans par la même méthode et avec le même succès. C'étoit une hernie Curale, où l'intestin et l'Epiploon étoient de la partie. après la dilatation graduée et ménagée, je fis rentrer l'intestin avec assez de facilité, la ligature faite à l'Epiploon, j'emportai la portion sortie, qui étoit un peu atterée, les accidens cessèrent, et la malade a guéri en peu de temps.

Au mois d'août 1752 j'éus appelé par M. Cheveneau mon Eleve
et mon confere pour donner conjointement avec M. M. Fauvin et Dejean,
notre avis sur une hernie crurale avec étranglement. Le sujet étoit une
fille âgée de 23 ans, la hernie étoit d'un petit volume, et malgré tout
le remède bien administré l'étranglement subsistoit depuis dix jours.
la malade vomissoit les matieres; le pouls étoit petit et concentré, le
ventre considérablement tendu; rien ne passoit; elle avoit des hoquets
fréquents. L'opération fut décidée sur le champ. Je proposai à ces
Messieurs de ne point faire de débridement avec le tranchant de
l'instrument; de se contenter de la simple dilatation. Ils goûterent
les raisons de préférence que j'en apportois, et l'expérience que j'en avois
les détermina. M. Cheveneau, qui opéra avec beaucoup de dextérité,
après avoir decouvert l'intestin, m'engagea à porter le doigt dans le
passage de l'intestin, pour y faire la dilatation, que j'avois proposée;
ce que je fis; la dilatation faite, il fut rentré l'intestin avec facilité.
Le 18^e Jour, la playe étoit parfaitement cicatrisée, la malade partit
pour la Ville de Pettrivier, lieu de sa demeure, et ne s'est depuis repentie

de sa hernie. *

Un Marinier, âgé de 50 ans, portoit depuis dix ans une hernie
dans l'aîne, qui ne pouvoit rentrer. cette hernie ne l'empêchoit pas
de vaquer à son métier. Revenant de Nantes à orléans, après, et
portant de l'argent dans son gousset, du côté de la hernie, le poids
et le frottement de cet argent sur la tumeur herniaire y occasionnerent
une inflammation considerable qui se termina par un abcès. Ce
dépôt, parvenu à sa maturité, fut ouvert: Mais quelle fut notre surprise
de trouver après l'évacuation du pus dans le fond du foyer de l'abcès,

nota. le 1^{er} Juillet
1760 M^{re} Cheveneau à
Vn cette fille qui est
femme de Chambre de
M^{re} Defarouville. Elle
ne porte point de bandage
sa hernie n'ayant
point reparu.



une hernie, dont le malade n'avoit rien dit. Ce fut dans ce moment
qu'il déclara qu'il portoit cette hernie depuis 10 ans. Le pus qui avoit
séjourné sur le sac herniaire l'avoit rendu extrêmement mince. Ce sac
fut ouvert; l'intestin y étoit seul et y avoit contracté plusieurs adhérences,
qui furent dissequées avec circonspection; L'anneau fut dilaté au
moyen de l'introduction du doigt et l'intestin entra avec facilité.
Cet homme a guéri en peu de temps continue son métier, qu'on seoit
être fort pénible sans porter de bandage et sans que la hernie ait

Jan 1760,
* notez cet homme
est actuellement en
bonne santé, il demeure
à Chartillon sur Loire,
C'est le passage de la
marque sur cette
rivière.

Depuis reparu *
Une jeune femme, âgée de 30 ans, atteinte d'une hernie avec
étranglement a été opérée par M. L'Herminier au moyen de la simple
dilatation, qu'il avoit vu pratiquer avec tant de succès, et la
malade continue ses travaux pénibles sans que la hernie ait reparu.

J'ai depuis fait en présence de plusieurs de mes confrères deux
opérations, on ne m'a employé que la simple dilatation, même
avec les deux doigts, un seul paroissant ne pas suffire. Les
malades ont guéri promptement, sans aucun ressentiment ni apparence
de hernie. Il est à remarquer qu'aucune de ces personnes opérées
par la dilatation ne porte de bandage.

L'adoption faite de cette méthode par un grand Chirurgien,
un habile opérateur qui est dans le cas de la pratiquer souvent,
semble encore l'autoriser. M. De la Groix, Chirurgien en Chef de
notre Hôpital, saisissant les raisons de préférence de la dilatation
sur le débridement, et ayant été témoin de la plupart des succès
et des avantages rapportés dans nos observations, s'est déterminé
à la pratiquer. Il vient de faire l'opération le 4 8^{bre} 1756, dans

notre hôpital, a vu homme âgé de 35 ans, avec tout le succès possible par la simple dilatation. Jugant qu'un doigt seul ne dilateroit pas l'anneau suffisamment, il en introduisoit successivement deux. Il fit ensuite rentrer l'intestin avec autant de facilité que s'il avoit fait à l'anneau la grande incision que M. Sharp prescrioit. Une portion Epiploïque, qui étoit de la partie, fut liée et emportée. Les accidens cessèrent, et le malade a guéri en peu de temps. Il est sorti de l'hôtel Dieu le 3 g^{bre} suivant.

Telles sont, Messieurs, les observations et les expériences qui m'ont fait connoître la possibilité de la dilatation, et la préférence quelle doit avoir sur la coupe ou le débridement.

Entrons maintenant dans le détail des raisons qui m'ont confirmé dans ce sentiment.

Article Troisième

Preuves tirées de l'autorité et de la Théorie.

L'observation, l'expérience même toutes constantes qu'elles semblent être, ne doivent jamais faire de règle dans un art scientifique, si elles ne sont guidées, appuyées et confirmées comme je l'ai déjà avancé par une saine théorie.

1^o Si nous parcourons la plus part des auteurs qui ont écrit sur les plaies ou la section des parties membraneuses et nerveuses, nous serons pleinement convaincus, que ces divisions quelque petites qu'elles soient, peuvent être suivies d'accidens, aussi ont-ils recommandé expressément d'éviter autant qu'il seroit possible, de porter le tranchant de l'instrument sur ces parties membrano-nerveuses: que lorsqu'il est nécessaire, dans une opération d'agrandir ou d'élargir un passage, un orifice membranaux trop étroit, comme,



par exemple, celui de la matrice ou de la Vessie, pour en extraire un corps étranger, il est préférable et beaucoup plus avantageux d'y faire de lentes et douces dilatations, que d'y porter l'instrument tranchant. *

2^o On sait que les parties membrano-nerveuses sont composées d'un tissu de fibres d'une grande finesse, conséquemment, susceptibles d'une prodigieuse extension. L'extrême dilatation ou se porte successivement la matrice, dans la grossesse, qui se fait sans rompre aucune de ses fibres, sans diviser leur texture naturelle, sans blesser ni déranger l'économie animale, en est une preuve bien sensible. La dilatation successive de l'orifice de ce Viscère dans l'accouchement, nous fait voir que cette dilatation est préférable à une coupe ou incision qu'une main téméraire voudroit y faire dans l'intention d'élargir ou d'aggrandir ce passage à fin de faciliter la sortie de l'Enfant.

Les bornes que je me suis prescrites dans ce mémoire ne permettent pas de rapporter toutes les preuves tirées de l'autorité et de la théorie, qui établissent incontestablement la dilatabilité des parties membrano-nerveuses. On feroit des Volumes si l'on vouloit démontrer plus au long, que dans une opération où il est question d'aggrandir une ouverture composée de fibres d'une grande finesse, la Dilatation graduée, ménagée et successive est préférable à l'incision.

3^o Pour prouver encore mieux la possibilité et la préférence de la Dilatation, faisons une succincte exposition anatomique de la composition et de l'arrangement des fibres de l'anneau que je propose de dilater.

* Nota Si les parties membrano-nerveuses sont irritées ou enflammées, comme il arrive quelque fois au périnée, à la membrane du fœtus-lata, la coupe ou le débilement devient absolument nécessaire, il n'en est pas de même de l'anneau ombilical ni de l'arcade crurale qui ne sont ni enflammées ni irritées, dans les hernies avec étranglement.

* Nota. Voyez le mémoire que M. Le Cat m'a adressé en 1768 inséré dans la 2^e partie de son Recueil sur la taille, et que j'ay communiqué dans le tems à l'Académie.

Cet Anneau est essentiellement composé de fibres membrano-nerveuses. La bande aponévrotique qui part du muscle grand oblique, descendant vers le Pubis, se divise en deux bandes; une supérieure ou antérieure, l'autre inférieure ou postérieure. La bande supérieure traverse la symphyse, et va s'attacher à l'os Pubis de l'autre côté, en se croisant avec la bande opposée. La bande inférieure va plus bas s'attacher à la partie moyenne de la Symphyse.

Ces deux bandes forment une ouverture ovale, plus étroite en bas, plus large en haut, arrondie en manière d'anse, à laquelle on a donné le nom d'anneau. Cette anse, cette portion d'anneau, est formée, dans l'adulte, de plusieurs fibres aponévrotiques qui se détachent obliquement de côté et d'autre. Il est essentiel de remarquer que ces fibres collatérales, qui se détachent obliquement pour venir former le petit bord arrondi, ou cette portion d'anneau, ne paroissent guères dans les Enfants.†

L.^e Cet exposé anatomique fait voir qu'il n'y a que cette portion d'anneau, ce petit bord arrondi, formé par les fibres collatérales dont je viens de parler, qui puisse s'opposer à la dilatation. Cette résistance des fibres collatérales est aisément vaincue par l'introduction du doigt, comme l'expérience nous l'a fait connoître dans les observations et dessus rapportées. Si ces fibres collatérales manquoient dans l'adulte ou qu'elles ne paroissent guères comme dans les Enfants, les hernies seroient plus communes, parce que les fibres longitudinales qui composent les deux bandes aponévrotiques, Denues des collatérales, ne sont, dans la partie supérieure de l'ouverture qu'elles forment, qu'adossées l'une à l'autre. on doit sentir, dans ce cas, que cet adossement de fibre résisteroit peu, et opposeroit une bien faible résistance à la sortie des parties flottantes.

† Exposition anatomique, de M. Winslow, trait. des muscles, N.^o 24.



Plus le sujet sera jeune, plus ce bord, cette portion d'anneau qui forme l'anne, prêtera; puisque dans les Enfants les fibres qui le composent ne paroissent gueres, et c'est directement la principale raison pour laquelle les Enfants sont plus sujets aux hernies que les adultes.

Ces fibres collatérales ne se forment donc, pour ainsi dire, et n'acquièrent de la fermeté qu'avec l'âge. Elles deviennent dans la vieillesse quelque fois cartilagineuses ou osseuses; aussi l'étranglement qui arrive aux hernies des Vieillards est-il souvent mortel.

5°. Si Ceux qui ont souffert l'opération par le débridement, sont, pour la plus part, dans la nécessité de porter le bandage, c'est que les fibres collatérales, qui viennent former le bord arrondi ou l'anne de l'anneau, ont été coupées et que par cette coupe les bords de la division se sont éloignés du centre, comme il arrive toujours à la section de parties membranées et ont laissé cette ouverture, dénuée de ses fibres collatérales, qui dans l'adulte resserrent l'anneau, et conséquemment s'opposent à la sortie des parties flottantes du bas Ventre.

La Coupe ou le débridement de l'anneau rend donc cette ouverture semblable à celle des Enfants, où les fibres collatérales ne paroissent gueres. De là l'ouverture plus lâche et plus grande, la sortie facile des parties flottantes, et la nécessité de porter le bandage.

6°. Il n'en est pas de même dans la dilatation; ces fibres étendues, allongées par degrés, semblables à celles de la matrice, ou autres parties membrano-nerveuses, portées à une extension ou dilatation même considérable, reprennent successivement leur longueur, leur ton et leur ressort naturel. aussi les personnes qui ont donné lieu à nos observations, ne sont pas obligées de porter de bandage, comme celles qui ont souffert le débridement; parceque d'un côté

les fibres qui forment le bord arrondi, cette portion d'anneau, sont restées entières; et d'un autre côté, la Cicatrice, qui se colle dessus, forme, non seulement un bouton solide, qui s'oppose à la sortie des parties flottantes; mais encore, lie, serre, et enchaîne, pour ainsi dire, ces fibres collatérales et leur donne conséquemment plus de fermeté, plus de résistance.

7.^o J'ai cru longtemps que l'Étranglement dans une hernie étoit causé par l'inflammation de l'anneau. La Raison et l'expérience ayant fait revenir de cette Erreur, j'ai jugé, au contraire, que l'étranglement étoit principalement causé par la tension, le gonflement et l'inflammation des parties qui forment la hernie. Si l'anneau n'est point enflammé, et que la prétendue inflammation qu'on y a longtemps soupçonnée, ne soit pas la cause de l'Étranglement, il prêteroit d'autant plus à la dilatation.

Les Praticiens remarqueront que l'anneau fait moins de résistance à la dilatation graduelle et ménagée que le col de la Vessie n'en oppose à la même dilatation dans l'opération de la taille au grand appareil, où l'on sçait que le col de la Vessie n'est le plus souvent, ni coupé ni débridé.

Si l'anneau est susceptible d'une dilatation suffisante et aussi grande que l'ouverture qui lui seroit procurée par la coupe ou le débridement, comme l'expérience et la théorie nous l'apprennent, la dilatation doit sans contredit, être préférée à toute incision.

Combien d'accidents éviteroit-on par par cette méthode? J'ai vu de grands Chirurgiens ouvrir l'intestin en faisant le débridement: on ne connoît que trop les suites fâcheuses d'un pareil accident.

8.^o La simple exposition anatomique de l'arcade crurale, ou se font les hernies de ce nom, fait voir que la dilatation s'y exécute encore plus aisément et plus facilement qu'à l'anneau inguinal.

Elle est principalement composée du Ligament inguinal ou Ligament de Fallope, par dessous lequel passent les Vaisseaux cruraux. Cette bande ligamenteuse et aponevrotique est tendue entre l'Epine antérieure Supérieure de l'os des Iles et l'Epine de l'os Pubis où elle est attachée.

Il faut remarquer que cette bande est fort étroite le long de ses parties moyennes, et qu'elle s'élargit considérablement vers ses extrémités; qu'il y a au dessous un tissu cellulaire assez ample, qui prête sur les côtés à une légère pression, qu'il ny a point de fibres collatérales, — comme à l'anneau, qui viennent fortifier l'ouverture par ou passent les parties qui forment la hernie, ce qui fait que cette ouverture prête davantage à la dilatation. La plus grande dilatation s'opère sur les Côtés dans le tissu Cellulaire, et en levant un peu vers le haut la partie la plus étroite de cette bande, on aggrandit suffisamment cette ouverture, pour y faire rentrer les parties sorties.

La même Expérience, la même Théorie confirment, donc comme à la hernie inguinale la possibilité et conséquemment la préférence de la dilatation que je propose pour la hernie crurale.

Toutes les fois qu'on pourra tirer un peu le paquet intestinal, qui forme la hernie à fin d'amener et mettre hors de l'anneau l'endroit de l'intestin étranglé, comme je l'ai décrit dans la première observation, et exécuté dans toutes les autres, Il faudra préférer la dilatation au débridement.

Un Chirurgien timide craindra peut-être de blesser l'intestin, en introduisant le doigt dans l'anneau. S'il a l'attention, comme nous venons de le dire, d'amener et mettre hors de l'anneau l'endroit de l'intestin étranglé, et de ne laisser dans le passage qu'une portion d'intestin qui n'aura point souffert de compression, il est sur que le doigt introduit par degrés ne meurtrira ni ne blessera l'intestin, quoique l'anneau semble ne vouloir par d'abord céder aux premières

Tentatives.

C'est sans doute, cette première résistance qui a fait penser aux maîtres de l'art, qu'il n'y avoit pas d'autre moyen, pour aggrandir ce passage, que la coupe ou le débridement, dans la crainte qu'il n'arrivât de meurtrir l'intestin comprimé dans le passage. Mais, avec les attentions et les précautions que nous venons de prescrire, cette première résistance sera aisément vaincue; et dès que les fibres collatérales dont j'ai parlé qui forment l'anneau commenceront à s'étendre, à s'allonger, et que l'anneau sera seulement aggrandi d'une demi-ligne; on sentira alors que l'anneau s'étend et prête facilement aux petits efforts qu'on fait pour le dilater.

9°. Il peut se trouver des cas où la dilatation quoique possible, ne seroit pas suffisante, pour faire rentrer, un très gros Volume d'intestins. Une opération faite dans notre hôpital par M. Delafroix en fournit une exemple. Le sexe ouvert nous fit voir que cette grosse hernie étoit formée de toute la poche Cecale, d'une grande portion du Colon et d'une plus grande de L'iléon. Nous ne pûmes faire rentrer ce gros Volume d'intestins 1°. qu'en débridant suffisamment l'anneau; 2°. en comprimant avec les deux mains le paquet intestinal, afin d'en chasser l'air et de le faire rentrer dans la continuité du Colon. Ces intestins vidés d'air, étant moins gros, ayant moins de volume, occupant moins d'espace, ont été remis dans la capacité. Le malade à guéri. Mais la hernie sort et rentre facilement. elle est maintenue avec un bandage.

Nous pouvons raisonnablement présumer que si nous avions été muni du dilatatoire dont la description termine ce mémoire il nous auroit procuré une Dilatation suffisante, sans être obligé d'être obligé de faire le Débridement.

Le Débridement est préférable à la dilatation lors que l'intestin

a contracté des adhérences à la circonférence de l'anneau, sur tout
il est impossible de disséquer ces adhérences sans débrider.

La Dilatation sera souvent impossible dans la Vieillesse, parceque
l'anneau se trouve quelque fois dans les personnes âgées,
cartilagineux ou osseux. mais il suffit que la dilatation réussisse
dans les cas les plus ordinaires, tels que ceux que nous avons
rapportés, pour en établir non seulement la préférence mais
encore la nécessité.

La description de l'instrument dilatoire termine la copie de ce
mémoire qui a été envoyé à l'Académie en 1756; Il paroit inutile de la
joindre ici, d'autant plus que cet instrument, a été depuis perfectionné.

On joint ici le détail des opérations faites par cette méthode
qui nous joint été comprises dans le second article de ce mémoire,
ainsi que celui des opérations faites depuis 1756, jusqu'au jour d'aujourd'hui.

I.^{re} Observation.

Au mois Octobre 1754, M. De la Croix fit par cette méthode l'opération
d'une hernie inguinale, à la femme du sieur Barreault Maître en
Chirurgie à Saugency. Le sac herniaire ouvert, fit voir l'intestin
gangrené et percé. Il dilata l'anneau avec le doigt, passa un anse
de fil dans le méscntère, et embrassa dans cet anse, le canal, et
laissa les bouts de fil, qui formoit cet anse, hors de la plaie, à fin
d'assujettir et de maintenir l'ouverture qu'il y avoit à l'intestin, au
niveau et vis à vis la plaie, et d'éviter l'épanchement des matières
intestinales dans la cavité. Il laissa la malade aux soins du
sieur Barreault son mary. telle chose que celui cy ait pu faire,
il ne pût empêcher qu'il ne se forma un anus par le quel les
matières ont coulé pendant neuf mois, lequel anus a été cicatrisé.

De la manière suivante.

Au mois de Juillet 1755, étant allé à Gaugency pour y faire une opération, le S^r Barreault vint me prier de voir son Epouse pour me consulter. J'allai voir cette infortunée; J'assistai à un des pensemens qu'on lui faisoit deux fois le jour. Chaque fois qu'on pensoit la malade, il sortoit par cet anus fistuleux une assez grande quantité de matières intestinales bilieuses. on appliquoit sur ce trou fistuleux un plumageau couvert de digestif, une emplâtre par dessus, des compressez, et le Spica pour bandage. Malgré cette Evacuation journalière, elle rendoit tous les 7, 8 à dix jours des matins par l'anus naturel, plus noires, plus solides et plus dures: ce qui me fit juger qu'il couloit encore des matières dans la continuité de l'intestin, puisqu'il en sortoit par l'anus naturel.

Je conseillai au sieur Barreault de commencer la Cure par des Clystères, de purger la malade avec la Cape et le petit lait, et qu'après avoir bien nettoyé le canal intestinal, de la mettre à une Diète sévère, avec bouillons pour toute nourriture. De lui faire user pour toute boisson de la potiffonne astringente, faite avec le Chiendent, La Rapure de corne de Cerf, la racine de consoude et la réglisse. De faire un pensement méthodique, qui devoit consister à toucher avec la pierre infernale les bourgeons qui entouraient le trou fistuleux; d'y appliquer la Charpie rappée et un bon tampon de Charpie brute, des compressez, et le Spica, afin de s'opposer à la sortie des matières, de les obliger d'enfiller la continuité inférieure de l'intestin, et d'y former une Cicatrice. Cette conduite ayant été régulièrement observée pendant quinze jours, les bourgeons ont été consummés et la Cicatrice s'est formée. La malade ne fut point à la selle pendant ces quinze jours. on eut le soin de maintenir, avec le Spica, pendant

quinze autres jours une plette de charpie sur la Cicatrice. Pendant
Ces 15 derniers jours, elle prenoit un Clystère tous les deux à trois jours,
afin d'éviter les Efforts qu'elle auroit pu faire pour aller à la Selle.
Elle s'accoutuma insensiblement à ne plus prendre de Clystère, et n'en
faisoit usage que dans une grande nécessité. Elle fut ensuite à la
Campagne pour prendre l'air. y étant restée quatre jours sans aller à
la Selle et voulant en pousser une, elle fit un Effort qui rompit et
ouvrit la cicatrice; dans l'instant la matière intestinale fusa par
la fistule. La malade prit sur le champ, le parti de revenir à sa demeure.
Son mary mit alors en usage les memes moyens qui lui avoient si
bien réussi. Enfin les matieres ont repris leur cours naturel, la fistule
s'est fermée, la cicatrice est solide. La malade est actuellement dans
l'embou point, jouit d'une sante parfaite, sans se ressentir de sa hernie.

II.^e Observation

Le 14 Mars 1755. M. Dejean fit l'opération par la meme Méthode
à la femme de Louis Barbon Vigon paroisse St. Vincent en présence de M.
Raby. C'étoit une hernie Crurale; la dilatation s'est faite avec le doigt.
Cette femme a été guérie et la plaie parfaitement cicatrisée en 25 Jours.

III.^e Observation

Le 26 Mars ^{x 1756}, le meme M. Dejean a fait l'opération par la meme
Méthode à Jean Villard Vigneron aux aydes. C'étoit une hernie inguinale,
il fit la dilatation avec le doigt. Il a été guéri et la plaie bien cicatrisée
le 29 Juin suivant.

IV.^e Observation

En 1757 le Vigneron du S.^r Calbert de la paroisse de rebrechien, âgé de
34 ans. se fit transporter à l'Hotel Dieu pour une hernie inguinale
avec étranglement accompagné des accidens les plus vifs. M.
De lafoix lui fit, en présence de Messieurs Guillon, Therveneau, Ballay,
Durie et moi, l'opération par la meme méthode, il se servit du

du gorgere dilatatoire. les accidens Cesserent; La Plaie se cicatrisée le 25^e jour. nous lavons vu depuis six mois. la hernie ne sort plus; la Cicatrice fait un bouton sur l'ouverture de l'anneau, qui empêche la sortie des parties.

V^e observation

Dans la même année 1757, un garçon menuisier âgé de 42 ans se fit transporter à l'Hôtel-Dieu pour une hernie inguinale avec étranglement; M. Delafroix l'opéra par la même méthode, en présence de M.^{rs} Ballay, Guillon, Sergent et moi. Il ne se servit que du doigt pour faire la Dilatation; la plaie a été parfaitement Cicatrisée en 28-jours, et la hernie ne sort plus.

VI^e observation

Le 15 février 1758, M. Sergent mon Confère fit en présence de M. Delafroix et moi, à la Veuve Latour de cette Ville, L'opération d'une hernie Crurale, quelle portoit depuis vingt ans, par la même méthode. Les accidens subsistoient depuis trois jours, malgré les remèdes appropriés. L'intestin étoit seul; la Dilatation a été faite avec le Gorgere Dilatatoire. la plaie a été Cicatrisée le 18^e jour. Elle jouit d'une bonne Santé et n'est plus obligée de porter de Bandage comme avant L'opération, la hernie n'ayant plus reparu depuis.

Le quatrième jour de L'opération assistant au pansement, j'examinai si le passage de l'arcade crurale qui avoit été dilaté par L'instrument s'étoit reserré. J'eus de la peine à y introduire le bout d'une sonde de poitrine ce qui me fit juger que ce passage s'étoit déjà considérablement reserré.



VII.^e Observation.

Le 16^e 8.^{bre} de la même année le même M. Sergent a fait en présence de M.^r Raby et Urvencau mes Confreres, L'opération d'une hernie crurale par la même méthode à la Damsioelle Paris âgée de 62 ans, dont la plaie a été parfaitement cicatrisée le 4 9.^{bre} suivant. la Dilatation a été faite avec le Doigt. Elle ne porte point de bandage, la hernie n'ayant plus reparu.

VIII.^e Observation.

Au mois de 9.^{bre} 1759 J'allai à quatre lieues d'Orleans, à la terre de M. de Silhouette pour faire L'opération à une de ses fermieres, âgée de 28 ans. c'étoit une hernie crurale. Je trouvais L'intestin gangrené. Je fis la dilatation avec l'instrument. Les accidents cessèrent immédiatement après, et je laissai la malade aux soins du s.^r Baudouin Chirurgien demeurant à une lieue de chez elle. Ce Chirurgien m'étant venu voir depuis, m'a rapporté, qu'il avoit trouvé l'intestin persé le troisieme jour de L'opération, que les matieres couloient par la plaie; que cet écoulement, cette fusion a subsisté pendant trois semaines; que la nature seule a guérie cette femme, ne l'ayant pensée que quatre fois. son mary voulant épargner les voyages de ce Chirurgien a continué de la penser lui même avec la Charpie sèche. quelle est parfaitement guérie, sans ressentir de la hernie.

IX.^e Observation.

Le 25 mars 1760. M. Delafroise a opéré par la même méthode à l'Hotel-Dieu, en presence de M.^r Guillon, Durie, Ballay, Prévost, et moy, le nommé Jacques Jannet, garçon menuisier, âgé de 28 ans, ayant élargi ou dilaté l'anneau avec le doigt. La Cicatrice a été

parfaite en moins de 25 jours. Il portoit cette hernie dès
sa tendre jeunesse. Elle ne sort plus et continue son travail,
sans porter de Bandage. M. de la Croix et moy l'avons visité
le 10 du présent mois de Juillet 1760, pour nous assurer de son état.

X.^e observation.

Le 22 avril dernier, M. De Jean a fait l'opération d'une
hernie Crurale, par la même méthode, à la veuve Larousse âgée
de 40 ans, en présence de M. de la Croix. La Plaie a été cicatrisée
le dixième jour. Elle portoit cette hernie depuis nombre d'années.
Elle étoit obligée d'avoir un bandage pour la maintenir. Depuis
l'opération, elle ne s'en sert plus, la hernie n'ayant plus reparu.

Dans la recherche que j'ai faite des succès de cette méthode d'opérer,
M. Guillon mon élève et mon confrère m'a remis le petit mémoire
cy après, qui renferme deux observations qui lui sont particulières.

» Je n'entrerois point, dit-il dans aucun détail sur l'opération
» de la hernie. Le seul objet qui m'a paru intéresser M. Le Blanc
» est de déterminer si dans cette opération la dilatation de l'anneau
» ou de l'arcade crurale est préférable à la section pour la rentrée
» des parties étranglées. Plusieurs observations multipliées ne laissent
» aucun doute pour l'affirmative de cette proposition. J'en pourrois
» citer un grand nombre d'exemple, suivi du plus grand succès,
» si les deux suivantes, et qui me sont des plus nouveaux, ne
» me paroissent suffire.

XI.^e observation

» La nommée Jeanne Mathieu domestique âgée d'environ 40 ans
» portoit depuis trois mois une hernie Crurale. Cette hernie à la
» quelle elle n'avoit point remède fut tout à coup suivi d'un étranglement

» et d'accidents si considérables qu'en moins de cinq heures, je fus
» néceffité de l'opérer. Ce que je fis en présence de M. Delafroix.
» L'intestin a découvert, je trouvais l'arcade si serrée et les parties si
» étranglées, que je craignois ne pouvoir réussir par la dilatation.
» Cependant après quelques tentatives et sans autre secours que le
» doigt indicateur, j'entraî, et tout de suite l'intestin suivi avec toute
» la facilité possible. La malade fut guérie parfaitement au bout
» de quinze jours, et depuis ce temps elle n'a plus ressentie aucun des
» accidents de sa hernie, quoiqu'elle n'ait porté aucun bandage.

XII.^e Observation

» Au mois de Janvier 1760, j'ai opéré avec la même facilité et
» par la même méthode, en présence de M. Barbet, la nommée Marie
» ficher femme de travail. Le succès a été aussi heureux qu'à la
» précédente. Je pourrois même ajouter qu'avant cette opération, cette
» femme avoit non seulement une hernie crurale, mais encore une
» vaginale, pour la quelle je m'étois proposé de lui placer un pessaire.
» Depuis l'opération ni l'une ni l'autre de ces maladies nous reparut,
» quoique cette femme depuis ce temps porte la charge à son ordinaire,
» sans bandage, ce quelle m'a certifié elle même depuis huit jours.

» Ces deux observations me paroissent suffisantes pour déterminer
» la préférence de la dilatation graduée à la section.

» Je ne dois point dissimuler que je suis redevable à M. Le Blanc
» de ce moyen aussi utile qu'avantageux. Il y a dix ans que me la
» proposé ainsi qu'à nombre de mes confrères. J'en ai toujours vu
» le plus grand succès, c'est un hommage que je dois à la vérité,
» et une justice à un confrère animé de l'amour de son état.

Délicré le Douze Juillet 1760. Signé Guillon.

Je puis ajouter que le célèbre M. Le Cat participant de la

dilatation graduée et ménagée du boudet intérieur du col de
la Vessie dans l'opération de la taille a adoptée cette méthode
et la pratiquée avec un égal succès. Le suffrage d'un
aussi grand praticien, celui des Chirurgiens de la Ville d'Orléans
portera vraisemblablement la célèbre académie de Chirurgie,
à donner un coup d'oïl sur ce mémoire. L'auteur espère
que quelques uns de ses membres voudront bien saisir
l'occasion de pratiquer cette méthode, afin de se convaincre,
par leurs propres expériences, de la possibilité, et de la préférence
de cette manière ou façon d'opérer.


Parcourant les auteurs qui ont écrit sur cette opération je viens
de trouver dans le Conspectus Chirurgiae de Jonkeu, un passage
qui fait sentir que la coupe ou le débâtement ne doit se faire que
dans le cas où il seroit impossible de dilater ou d'aggrandir
l'anneau avec le doigt. » Lorsque les anneaux sont tellement resserés,
» dit-il, qu'ils ne peuvent permettre la rentrée aux parties qui forment
» la hernie, et que par conséquent il y a étranglement; alors il faut
» dilater. Cette dilatation continue-t-elle, se fait ou par le moyen du doigt,
» ou avec le bistouri caché, par le moyen du quel on fait une grande
» incision; ou, ce qui paroît préférable, plusieurs petites incisions à
» la circonférence de l'anneau. Quando autem annuli
» adeo angustati sunt, ut partes prolapsae par eodem possint reponi,
» tunc illi dilatandi sunt. Instituitur talis dilatatatio vel mediante
» digito, vel novo illo instrumento Bistouri caché dicto, mediante
quo incisio magna, vel quod melius videtur, multe parvulae in
peripheria annuli efficiuntur. *

* Jonkeu. conspectus Chirurgiae. Halae. 1721. Tabula 29. de herniis. page. 211. Lett. C. D.



Jonckevo pensoit donc avant moi, et j'avoue que je n'ai lu ce passage
qu'aujourd'hui, que l'aggrandissement ou la dilatation de l'anneau
pouvoit se faire avec le doigt. Il commence par donner ce moyen.
(Sans doute comme le plus convenable) et si ce moyen est impossible,
quoi qu'il ne le dise pas, il préfère les petites incisions faites à la
circonférence de l'anneau, à la grande incision exécutée par le bistouri
caché. Ce Praticien, cet observateur connoissoit donc les dangers de cette
grande incision, puisqu'il conseil de préférer les petites faites à la
circonférence de l'anneau. S'il avoit été convaincu, comme nous,
de la possibilité de l'aggrandissement ou dilatation de l'anneau, sans y
porter le tranchant de l'instrument, qui est praticable dans presque
tous les cas; je suis certain, et son texte le fait assez sentir, qu'il
auroit reproché l'usage du bistouri caché, pour cet opération, et
tout autre instrument tranchant.

C'est maintenant à l'expérience à justifier cette méthode. nous
ne doutons pas un instant que les succès quelle à eû entre nos
mains et entre celles de ceux qui l'ont pratiquées ne se multiplient
entre les mains de ceux qui voudront l'adopter.



Exécutoire par le bistouri
soit donc les dangers de cette
les

68.04

Dilatation de l'anneau sans incision
m. labiale associée

n° 5

ARC 16 d. 4 n° 110